

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Продукт	Действующие вещества	Способ применения и дозы	Основные показания к применению	Целевые виды
АНТИБИОТИКИ				
1 Амоксилайф-LA [®] Суспензия для инъекций	Амоксициллин 150 мг	КРС, МРС, свиньи: 1 мл/10 кг м.т. в/м Кошки и собаки: 1 мл/10 кг м.т. в/м или п/к	Инфекции ЖКТ, респираторные и другие заболевания, вызываемые чувствительными к амоксициллину микроорганизмами	
2 Амоксилайф Адванс [®] Суспензия для инъекций	Амоксициллин 150 мг Гентамицин 40 мг	КРС, МРС, свиньи: 1 мл/10 кг м.т. в/м Кошки и собаки: 1 мл/10 кг м.т. в/м или п/к	Инфекции ЖКТ, респираторные заболевания, сепсис, перитонит, пиелонефрит, артрит, раны, послеоперационные осложнения, маститы, эндометриты	
3 Азитростар [®] Раствор для инъекций	Азитромицин 100 мг	КРС, свиньи, овцы: 1 мл/20 кг в/м 1 раз в сутки	Инфекции ЖКТ, дыхательных путей, мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, некробактериоз, рожа свиней, спирохетоз, микоплазменные инфекции	
4 Цефквитал [®] Суспензия для инъекций	Цефкином 25 мг	КРС, МРС: 1 мл/25 кг м.т. в/м Свиньи: 1-2 мл/25 кг м.т. в/м Свиноматки: 2 мл/25 кг м.т. в/м Кошки и собаки: 0,5 мл/5 кг м.т. в/м или п/к	Инфекции дыхательных путей, инфекционные заболевания конечностей, септицемия у телят, острый мастит и вторичные инфекции на фоне вирусных заболеваний у коров, синдром MMA у свиней	
5 Цефтивет [®] Суспензия для инъекций	Цефтиофуру 50 мг	КРС, МРС: 1 мл/50 кг м.т. в/м Свиньи: 1 мл/16 кг м.т. в/м Лошади: 1 мл/50 кг м.т. в/м Собаки: 0,2 мл/5 кг м.т. в/м	Инфекции мягких тканей и дыхательных путей, некробактериоз, эндометрит и другие заболевания, вызываемые чувствительными к цефтиофуру микроорганизмами	
6 Цефтивет Адванс [®] Суспензия для инъекций	Цефтиофуру 50 мг Кетопрофен 150 мг	КРС: 1 мл/50 кг м.т. в/м	Инфекции мягких тканей и дыхательных путей, некробактериоз, эндометрит с сопутствующими клиническими признаками воспаления и пирексии	
7 Эверодокс WSP [®] Порошок для приготовления раствора для орального применения	Доксициклин 500 мг	Телята, ягнята: 3-4 мг/кг 2 раза Свиньи: 5-8 мг/кг 2 раза Птицы: 0,2 кг/л питьевой воды в течение 3-5 дней	Энзоотическая пневмония, плевропневмония, атрофический ринит, сальмонеллез, колибактериоз, дизентерия, лептоспироз, стафилококкоз, стрептококкоз, пастереллез, микоплазмоз, смешанные инфекции и бактериальные осложнения вирусных инфекций	
8 Энфлорекс [®] Раствор для инъекций	Энрофлоксацин 100 мг	КРС: 0,5 мл/10 кг м.т. в/м МРС: 0,5 мл/20 кг м.т. в/м Свиньи: 1 мл/40 кг м.т. в/м Собаки: 0,5 мл/10 кг м.т. в/м	Инфекции органов дыхания, ЖКТ, мочеполовой системы (синдром MMA), кожи и мягких тканей, вторичные инфекции, вызванные чувствительными к энрофлоксацину микроорганизмами	
9 Энфлорекс [®] Раствор для орального применения	Энрофлоксацин 100 мг	КРС, МРС, свиньи: 1 мл/20 кг м.т./сутки 3-5 дней Птица: 1 мл/20 кг м.т./сутки при добавлении в питьевую воду	Колибактериоз, сальмонеллез, стрептококкоз, микоплазмоз, некротический энтерит и другие заболевания телят, ягнят, поросят и птиц вызванные микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину	
10 Флоррелиф [®] Раствор для инъекций	Флорфеникол 300 мг Флуниксин 16,5 мг	КРС, свиньи: 2 мл/15 кг м.т. п/к в область шеи	Заболевания органов дыхания, мочеполовой системы и ЖКТ у свиней и КРС	
11 Люфлоран [®] Раствор для инъекций	Флорфеникол 300 мг	КРС, МРС: 1 мл/15 кг м.т. в/м в область шеи двукратно с интервалом 48 часов либо 2 мл/15 кг м.т. п/к однократно Свиньи: 1 мл/20 кг м.т. в/м в область шеи двукратно с интервалом 48 часов	Инфекции дыхательных путей, инфекционные заболевания конечностей, диарея бактериальной этиологии у телят	
12 Левовитал [®] Раствор для инъекций	Левифлоксацин 150 мг	КРС, свиньи: 1 мл/30 кг м.т. в/м в течение 3-5 дней	Инфекции ЖКТ, респираторные заболевания, состояния, требующие хирургического вмешательства, мастит, агалактия у свиней и другие заболевания, вызванные микроорганизмами, чувствительными к левифлоксацину	
13 Левовитал [®] Раствор для орального применения	Левифлоксацин 150 мг	Свиньи, птица: 1 мл/20 кг м.т. в течение 3-5 дней	Инфекции, вызванные микроорганизмами, чувствительными к левифлоксацину	
14 Марбопрайм [®] Раствор для инъекций	Марбофлоксацин 100 мг	КРС: 2 мл/25 кг м.т. при респираторных инфекциях 1 мл/50 кг м.т. при мастите Свиньи: 1 мл/50 кг м.т. в/м в область шеи	Респираторные инфекции, мастит, синдром MMA	
15 Спиралайф [®] Раствор для инъекций	Спирамицин 600 000 ME	КРС: 5 мл/100 кг м.т. Телята, свиньи: 5 мл/40 кг м.т. глубоко в/м	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного и респираторного тракта, вызываемые микроорганизмами, чувствительными к спирамицину	
16 Тетралайф-LA [®] Раствор для инъекций	Окситетрациклин 200 мг	КРС, МРС, свиньи: 20 мг/1кг м.т. в/м или 1 мл/10 кг м.т. 1 раз в трое суток, но не более трех раз	Бронхопневмония, колибактериоз, сальмонеллез и др. заболевания свиней, КРС, овец и коз, вызванные микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину	
17 Тетралайф [®] Адванс [®] Раствор для инъекций	Окситетрациклин 300 мг Флуниксин 20 мг	КРС: 1 мл/10 кг м.т. в/м однократно	Острые и хронические респираторные заболевания, заболевания мочеполовой системы, ЖКТ, кожи, опорно-двигательного аппарата, колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, гастроэнтероколит, послеоперационные и после родовые осложнения	
18 Тулатрам [®] Раствор для инъекций	Тулатромидин 100 мг	КРС: 1 мл/40 кг м.т. п/к однократно Свиньи: 1 мл/40 кг м.т. в/м однократно в область шеи	Бактериальные инфекции органов дыхания, вызываемые <i>Mannheimia (Pasteurella) haemolytica</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Haemophilus somnus</i> и <i>Mycoplasma bovis</i> , инфекционный кератоконъюнктивит, вызываемый <i>Moraxella bovis</i> и <i>Neisseria spp.</i>	
ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ				
19 Комбимаст [®] Суспензия для интрацестерального применения в период лактации	Инъектор (5 г) содержит: прокаин пенициллин G 100.000 ME стрептомицина сульфат 100 мг неомицина сульфат 100 мг преднизолон 10 мг	1 инъектор трехкратно с интервалом в 24 ч	Лечение мастита в лактационный период	
20 Нафцивет-ДС [®] Суспензия для интрацестерального применения в сухостойный период	Инъектор (3 г) содержит: прокаина бензилпенициллин 300 мг гидрострептомицин 100 мг нафциллин 100 мг	В разовой дозе 3,0 г (1 инъектор) в каждую четверть вымени	Лечение и профилактика мастита в сухостойный период	
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ				
21 Диффикарб [®] Раствор для инъекций	Имидокарб 85 мг	КРС, МРС: 0,1 мл/10 кг в/м Лошади: 2 мл/100 кг в/м Собаки: 0,25-0,5 мл/10 кг в/м	Профилактика бабезиоза и анаплазмоза	
22 Иверексан [®] Раствор для инъекций	Ивермектин 10 мг	КРС, лошади: 1 мл/50 кг м.т. п/к МРС: 0,5 мл/25 кг м.т. п/к Свиньи: 1 мл/33 кг м.т. п/к Кролики: 0,1 мл/5 кг м.т. п/к	Профилактика и лечение заболеваний, вызванных нематодами, вшами, личинками оводов, клещами и другими членистоногими	
23 Доравексан [®] Раствор для инъекций	Дорамектин 10 мг	КРС: 1 мл/50 кг м.т. п/к МРС: 1 мл/50 кг м.т. в/м Свиньи: 1 мл/33 кг м.т. в/м	Назначают для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых нематодами, личинками подкожных и носоглоточных оводов, личинками мух, блохами, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами	
24 Эпринайс [®] Раствор для инъекций	Эприномектин 10 мг	КРС, МРС, лошади: 1 мл/50 кг м.т. п/к или в/м Свиньи: 1 мл/33 кг м.т. в/м Собаки, кошки: 0,2 мл/10 кг м.т. однократно При необходимости повторить через 14 дней	Назначают при нематодозах, а также для борьбы с падальными и мясными мухами и другими паразитами, чувствительными к эприномектину	
25 Намедол [®] Суспензия для орального применения	Альбендазол 100 мг	КРС: 0,75-1 мл/10 кг м.т. МРС: 0,75-1,5 мл/10 кг м.т.	Профилактика и лечение нематодозов, трематодозов и цестодозов	
АНТИКОКЦИДИЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ				
26 Толтразор [®] 2,5% Раствор для орального применения	Толтразурил 25 мг	28 мл/100 кг м.т. при добавлении в питьевую воду	Профилактика и лечение эймериоза (кокцидиоза)	
27 Толтразор [®] 5% Суспензия для орального применения	Толтразурил 50 мг	Телятам: 3 мл/10 кг м.т. Ягнятам: 0,4 мл/1 кг м.т. Поросятам: 1 мл/2,5 кг м.т.	Профилактика и лечение эймериоза (кокцидиоза)	
ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ				
28 Дексапрайм [®] Раствор для инъекций	Дексаметазон 4 мг	Лошади, КРС: 5 мл Свиньи: 2-3 мл Поросята, собаки: 0,5-1 мл Кошки: 0,25-0,5 мл один раз в день в течение трех суток	Кетоз, токсемия; артриты, периартриты, тендовагиниты, бурситы, вывихи, миозиты; атопический и контактный дерматиты, крапивница, зуд, конъюнктивит; ламиниты у лошадей и КРС; укусы змей и насекомых; стрессовые (выставки, тренировки) и шоковые состояния	
29 Флуналгин [®] Раствор для инъекций	Флуниксин 50 мг	Лошади: 1 мл/45 кг п/к или в/в КРС, свиньи: 2 мл/45 кг п/к или в/в	Противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее средство	
30 Кетапрын [®] Раствор для инъекций	Кетопрофен 100 мг	КРС: 3 мл/100 кг м.т. в/в или в/м Свиньи: 3 мл/100 кг м.т. в/м Лошади: 1 мл/45 кг м.т. в/м	Противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее средство	
31 Ломекам [®] Раствор для инъекций	Мелоксикам 20 мг	КРС: 2,5 мл/100 кг м.т. п/к или в/в Свиньи: 2,0 мл/100 кг м.т. в/м	Противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее средство	
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ				
32 Селенвет-В [®] Эмульсия для инъекций	Натрия селенит 1 мг Витамин Е 60 мг Витамин В1 40 мг	КРС, МРС, овцы: 1 мл/50 кг м.т. п/к или в/м	Комплексный препарат для профилактики и лечения алиментарной мышечной дистрофии, миоглобурии, энцефаломалиции, мышечной дистрофии	
33 Витабутан [®] Раствор для инъекций	Бутафосфан 100 мг Витамин В12 0,05 мг	КРС, лошади: 5-25 мл на животное МРС: 2,5-8 мл на животное Свиньи: 2,5-10 мл на животное Птица: 1-3 мл/л питьевой воды	Комплексный препарат для повышения резистентности организма и регулирования обмена веществ	
34 Бетакартин-Аква [®] Раствор для инъекций	Бета-каротин 10 мг	Лошадям: 20 мл 1-3 раза с интервалом 14 дней глубоко в/м КРС: 20-25 мл 1-3 раза с интервалом 14 дней в/м, п/к Телятам: 5 мл сразу после рождения в/м, п/к Свиньям: 7 мл в/м в день осеменения	При нарушении обмена веществ, для повышения иммунитета, а также для повышения репродуктивной функции животных	
35 МультиWVet [®] Раствор для инъекций	В 1 мл содержится: витамин А 50 000 ME; витамин D3 25 000 ME; витамин Е 4 мг; витамин В1 10 мг; витамин В2 0,04 мг; витамин В6 1 мг; витамин В12 0,01 мг; витамин В5 2 мг; витамин В3 5 мг; витамин В8 2 мг; метионин 5 мг; холина цитрат 5 мг; гипофосфит магния 1 мг; кобальта хлорид 0,02 мг; меди сульфат 0,1 мг; цинка сульфат 0,1 мг; марганца сульфат 0,1 мг; селен 0,7 мг; бензиловый спирт 15 мг; вода для инъекций до 1 мл	КРС, лошади: 2-6 мл/100 кг м.т. Свиньи, МРС: 5-8 мл/50 кг м.т. Поросята, телята, козлята и ягнята: 1-1,5 мл/10 кг м.т. Собаки, кошки: 0,5-1 мл/10 кг м.т.	Профилактика и лечение нарушений обмена веществ; повышение сопротивляемости организма к инфекционным болезням; восстановительный период после перенесенных заболеваний; поддержание высокого уровня продуктивности и повышение физической выносливости животных	